

# Vitergan<sup>®</sup> Pré-Natal

**Polivitamínico e Polimineral**

**Uso oral**

**Uso adulto**

**Forma farmacêutica e apresentação** - *Comprimidos revestidos*: Cartucho com 30 comprimidos.

**Composição** - Cada comprimido revestido contém: Acetato de retinol (vitamina A) 4.000 UI (150%\*) (141%\*\*); Colecalciferol (vitamina D<sub>3</sub>) 400 UI (200%\*) (200%\*\*); Ácido ascórbico (vitamina C) 65 mg (118%\*) (93%\*\*); Tiamina (vitamina B<sub>1</sub>) 1,5 mg (107%\*) (100%\*\*); Riboflavina (vitamina B<sub>2</sub>) 1,7 mg (121%\*) (106%\*\*); Nicotinamida 20 mg (111%\*) (118%\*\*); Cloridrato de piridoxina (vitamina B<sub>6</sub>) 2 mg (105%\*) (100%\*\*); Pantotenato de cálcio 10 mg (167%\*) (143%\*\*); Ácido fólico 0,4 mg (113%\*) (136%\*\*); Cianocobalamina (vitamina B<sub>12</sub>) 6 mcg (231%\*) (214%\*\*); Cálcio 250 mg (21%\*) (25%\*\*); Ferro 40 mg (148%\*) (267%\*\*); Iodo 0,15 mg (75%\*) (75%\*\*); Cobre 1 mg (100%\*) (77%\*\*); Magnésio 5 mg (2,3%\*) (1,85%\*\*); Manganês 1 mg (50%\*) (38%\*\*). Excipientes: Estearato de magnésio, dióxido de silício, polietilenoglicol, dióxido de titânio, eudragit, talco, corante vermelho e amarelo, trietilcitrato, amido glicolato de sódio. (\* Teor percentual do componente na posologia máxima relativo à ingestão diária recomendada para gestantes. \*\* Teor percentual do componente na posologia máxima relativo à ingestão diária recomendada para lactantes.)

**Indicações** - A principal indicação de VITERGAN PRÉ-NATAL é como suplemento vitamínico-mineral na gravidez e na lactação, principalmente quando existe quadro de anemia. Também é empregado em pacientes em regimes dietéticos com carência de ferro devido a sucessivas gestações. Poderá ser utilizado em situações em que há aumento na utilização de vitaminas, doenças febris prolongadas e hipertireoidismo.

**Contraindicações** - Hipersensibilidade comprovada aos componentes da fórmula.

**Precauções e advertências** - Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente o seu médico em caso de gravidez. VITERGAN PRÉ-NATAL não é indicado para o tratamento de anemia perniciosa. Uma vez que o ácido fólico pode mascarar os sintomas da anemia perniciosa, recomenda-se que nenhum medicamento seja ingerido sem o prévio aconselhamento médico.

**Interações medicamentosas** - O ferro contido em VITERGAN PRÉ-NATAL impede o uso concomitante com tetraciclina, já que um impede a absorção do outro. Se o uso concomitante for realmente preciso, deve haver um intervalo mínimo de 2 horas entre a administração dos medicamentos.

**Reações adversas** - VITERGAN PRÉ-NATAL é usualmente bem tolerado.

**Posologia** - Deve ser ingerido um comprimido de VITERGAN PRÉ-NATAL ao dia, ou a critério médico.

Venda Sob Prescrição Médica.

Registro no M.S. 1.0155.0203.

**MARJAN Indústria e Comércio Ltda.**